

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ตามกรมการแพทย์ 5 กพ 63)

กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข รพ ปากท่อ

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

- 1) กรณีผู้ป่วยไม่มีอาการปอดอักเสบ เก็บ nasopharyngeal swab และ throat swab / oropharyngeal swab ใส่ทั้ง 2 swab ในหลอด UTM หรือ VTM หลอดเดียวกัน จำนวน 1 ชุด
- 2) กรณีผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ
 - a. กรณีไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ
 - i. เก็บเสมหะใส่ในหลอด UTM หรือ VTM จำนวน 1 หลอด
 - ii. เด็กอายุ < 5 ปี หรือผู้ที่ไม่สามารถเก็บเสมหะได้ ให้เก็บ nasopharyngeal swab และ throat swab / oropharyngeal swab หรือ suction ใส่ในหลอด UTM หรือ VTM เดียวกัน จำนวน 1 ชุด
 - b. กรณีใส่ท่อช่วยหายใจ
 - i. เก็บ tracheal suction ใส่ในหลอด UTM หรือ VTM จำนวน 1 หลอด

กรณี ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (1 ห้องปฏิบัติการ)

- 1) พิจารณาดูแลรักษาตามความเหมาะสม
- 2) สามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ ถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ในการนอนโรงพยาบาลและแนะนำการปฏิบัติตัว
- 3) กรณีอาการไม่ดีขึ้น พิจารณาตรวจ 2019 -nCoV ซ้ำได้

กรณี พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

- 1) Admit single isolation room หรือ cohort ward (ที่มีเฉพาะ confirmed case) ที่ระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย 1 เมตร
- 2) กรณีอาการรุนแรง หรือต้องทำหัตถการที่มี aerosol ให้เข้าห้อง AIIR
- 3) Supportive treatment
- 4) ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ